

インフルエンザHAワクチン予防接種 予診票

※ 接種当日、太枠内をボールペンで記入してください

※ 体温は、当日、来所前に測定してきてください

			当日の体温	度	分
学籍・職員番号			携帯・内線番号		
フリガナ		男・女	生年月日	昭和	年 月 日生
氏 名				平成	(歳)

質問事項	回答欄	
1. 今日受けられる予防接種についての説明文を読んで理解しましたか。	いいえ	はい
2. 今日、普段と違って具合の悪いところがありますか。	ある(具体的に)	ない
3. 現在、何かの病気で医師にかかっていますか。	はい(病名)	いいえ
4. 最近1ヵ月以内に何か病気にかかりましたか。	はい(病名)	いいえ
5. 1ヵ月以内に家族や周囲で麻疹、風しん、水痘、おたふくかぜなどにかかった方がいますか。	いる	いない
6. 4週間以内に予防接種を受けましたか。	ある(予防接種名・日付)	ない
7. 今までに特別な病気(先天性異常、心臓、腎臓、肝臓、血液疾患、脳神経、免疫不全症、悪性腫瘍、その他の病気)にかかり、医師の診断を受けたことがありますか。	ある(具体的に)	ない
〔ある〴〵の場合〕 その病気を診てもらっている医師に、今日の予防接種を【受けて良い】と言われましたか。	いいえ 未許可では、接種できません	はい
8. 今までにひきつけ(けいれん)を起こしたことがありますか。	ある 最後は 年 月ごろ	ない
〔ある〴〵の場合〕 ひきつけ(けいれん)を起こしたとき、熱は出ましたか。	はい (℃)	いいえ
9. 今までに間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患と診断されたことがありますか。	ある 治療中・治療していない	ない
10. 薬や食品(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹や蕁麻疹が出たり、体の具合が悪くなったことがありますか。	ある(薬、食品名)	ない
11. インフルエンザの予防接種を受けたことがありますか。	ある(年 月頃)	ない
〔ある〴〵の場合〕 その際に具合が悪くなったことはありますか。	ある	ない
12. インフルエンザ以外の予防接種の際に具合が悪くなったことがありますか。	ある(予防接種名)	ない
13. 近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか。	いる	いない
14. 近親者の中に予防接種を受けて、具合が悪くなった方はいますか。	いる(予防接種名)	いない
15. 【女性の方に】現在、妊娠していますか。または可能性がありますか。	はい	いいえ
16. その他健康状態のことで医師に伝えておきたいことがあれば具体的にご記入ください。(投薬状況など)		
17. 予防接種の効果や副反応について理解しました。以上の内容に同意し(未成年者の場合は、保護者の同意も得た上で)、接種を希望しますか。	いいえ	はい
本人の署名: _____		

医師記入欄			
以上の問診および診察の結果、今日の予防接種は(実施できる ・ 見合わせたほうがよい)と判断します。接種を受ける本人(またはその保護者)に対して、予防接種の効果、副反応および医薬品医療機器総合機構法に基づく救済について説明しました。 医師の署名または記名押印 [_____]			
使用ワクチン名	接種量	実施場所・医師名・接種年月日	
インフルエンザHAワクチン フルービックHAシリンジ 一般財団法人 阪大微生物病研究会 (販売: 田辺ファーマ株式会社)	Lot No. _____ 皮下接種 0.5 mL (3歳以上)	実施場所 : 筑波大学保健管理センター 医師名 : _____ 接種年月日: _____	

インフルエンザワクチンの接種を受けられる方へ

〈ワクチンの効果と副反応〉

ワクチンの接種により、インフルエンザの発症を予防したり、たとえ発症しても症状が軽くすみます。そのため、インフルエンザによる重症化や死亡を予防する効果が期待されます。

副反応としては、まれにワクチンの接種直後から数日中に、発疹、じんましん、湿疹、紅斑、多形紅斑、かゆみ、血管性浮腫などがあらわれることがあります。全身症状として、発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、嘔吐・嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、関節痛、筋肉痛、咳嗽、動悸、筋力低下など、また局所症状として接種部位に発赤、腫脹、硬結、熱感、疼痛、しびれ感、小水疱などが認められることがありますが、いずれも通常2～3日で消失します。蜂巣炎（細菌による化膿性炎症）、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢性ニューロパチー、失神・血管迷走神経反応、しびれ感、振戦、ぶどう膜炎があらわれることがあります。非常にまれですが、次のような重大な副反応がみられることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー（じんましん、呼吸困難、血管性浮腫など）、(2)急性散在性脳脊髄炎（ADEM）（接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など）、(3)脳炎・脳症、脊髄炎、視神経炎、(4)ギラン・バレー症候群（両手足のしびれ、歩行障害など）、(5)けいれん（熱性けいれんを含む）、(6)肝機能障害、黄疸、(7)喘息発作、(8)免疫性血小板減少症、血小板減少、(9)血管炎（IgA血管炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、白血球破砕性血管炎など）、(10)間質性肺炎、(11)皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症、(12)ネフローゼ症候群。なお、副反応による健康被害が生じた場合の救済については、健康被害を受けた人または家族が独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法に基づいて手続きを行うことになります。

〈予防接種を受けることができない人〉

- ① 明らかに発熱のある人（37.5℃以上）
- ② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- ③ 過去にインフルエンザワクチンに含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある人（他の医薬品投与でアナフィラキシーを起こしたことがある人は、予防接種を受ける前にお医者さんへその旨を伝え、判断を仰いでください）
- ④ その他、お医者さんが予防接種を受けることが不相当と判断した人

〈予防接種を受ける際に、お医者さんとよく相談しなくてはならない人〉

- ① 発育が遅く、お医者さんや保健師さんの指導を継続して受けている人
- ② カゼなどのひきはじめと思われる人
- ③ 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気などの基礎疾患がある人
- ④ 前回の予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた人
- ⑤ 今までにけいれんを起こしたことがある人
- ⑥ 過去に免疫不全と診断されたことがある人および近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
- ⑦ 間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患のある人
- ⑧ 薬の投与または食事（鶏卵、鶏肉など）で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある人
- ⑨ 妊娠の可能性のある人

〈予防接種を受けたあとの注意〉

- ① 接種後30分間は病院にいるなどして様子を観察し、アレルギー反応などがあればお医者さんとすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- ② 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすことはやめましょう。
- ③ 接種当日は接種部位を清潔に保ち、いつもの生活をしましょう。ただし、はげしい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- ④ 高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかにお医者さんの診察を受けてください。

あなたの接種予定日		医療機関名
月	日()です	
当日は受付に		
時	分頃おこしてください	